

Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 11 du 27 mai 1986

BLE D'HIVER

* **MALADIES** : contre les maladies du feuillage, septoriose surtout, une protection est nécessaire à l'épiaison du blé ; l'épiaison a démarré dans les parcelles précoces.

MAIS

* **DESHERBAGE ANTIDICOTYLEDONE** : Respectez les stades d'emploi des produits

BLE D HIVER


MALADIES : SEPTORIOSE TOUJOURS...

L'épiaison commence actuellement en situations précoces. La majorité des parcelles est au stade "gonflement" et sera en début d'épiaison la semaine prochaine.

La septoriose constitue toujours le risque n° 1. Il est maintenant fréquent d'observer des attaques sur 2e feuille, notamment sur semis précoces et dans certains secteurs climatiques.

L'oidium est observé dans certaines parcelles des Rieds, de la Hardt et parfois du pays de WISSEMBOURG.

Aucune attaque de **rouille brune** n'est encore signalée.



Stade début épiaison

7203

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant : D. CALLU

Publication Périodique
CPPAP N° 1848 AD
Abonnement Annuel : 130 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
D.R.A.F.

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 88.37.32.18
Bas-Rhin : 88.69.65.89 - Haut-Rhin : 89.41.11.68



Nos conseils

1er cas : Vous avez traité depuis moins de 3 semaines avec un fongicide efficace contre septoriose :

Attendez pour intervenir que tous les épis soient sortis (pas avant la semaine du 2 au 7 juin). Vous aurez ainsi une protection fongicide assez longue après l'épiaison.

2e cas : Vous n'avez pas encore traité.

En présence de septoriose sur 3e feuille ou à fortiori sur 2e feuille : traitez rapidement dès la sortie des épis.

En absence de septoriose sur feuilles supérieures (cas rare !), attendez pour intervenir le stade 50 à 80 % des épis sortis.

Choix du produit

Reportez vous au tableau "fongicide" paru dans le bulletin n° 9 du 13 mai.

Utilisez un produit figurant dans les parties 1,2 ou 5 du tableau et ayant une bonne efficacité contre septoriose (++), et sur oïdium si cette maladie est présente.

Si vous avez employé au 1er traitement, un produit contenant du carbendazime ou du méthyl-thiophanate, préférez un produit de la partie 5 du tableau pour limiter les risques d'apparition du piétin verse résistant aux B.M.C.

Rouille brune : bien qu'elle soit absente jusqu'à présent, on ne peut encore écarter le risque. En conséquence, dans les parcelles à haut potentiel ou si l'on recherche "l'assurance", on pourra préférer un fongicide également efficace contre cette maladie.

M A I S

DESHERBAGE ANTIDICOTYLEDONE : RESPECTEZ LES STADES D'EMPLOI DES PRODUITS

La croissance du maïs a été très rapide au cours de la dernière semaine.

Si vous aviez prévu un désherbage en plein contre les dicotylédones résistantes et que vous ne l'avez pas encore réalisé, attention à ne pas dépasser le stade d'emploi des produits par rapport au stade du maïs.

Stade limite d'emploi

- . Herbogil : stade 4 feuilles du maïs
- . Buctril : stade 6 feuilles du maïs
- . Dicoprime - Litarol M - Merit - Sabre : stade 8 feuilles du maïs,
- . Basagran + Huile - Laddok - Lentagran - Pyron : pas de stade limite.

Pour être correctement efficaces, les produits doivent aussi être appliqués au stade optimum des adventices - reportez- vous au dépliant SPV-AGPM qui vous a été adressé avec le bulletin n° 4 du 14 avril.